

সবার জন্য ভ্যাকসিনি

Pfizer COVID-19 ভ্যাকসিনি

- + প্রাপ্তবয়স্কদের ডে জ
- + 6 মাস বা তার বেশি বয়সী শিশুদের ডে জ
- + যারা ইমিউনে কম্প্রবে আইজড তাদের জন্য প্রাথমিক সিরিজের অতিরিক্ত ডে জ
- + বুস্টার শট

যে গ্য ব্যাক্তিদের জন্য এখানে উপলব্ধ রয়েছে

COVID-19 নয়, নিজেকে এবং আপনার পরিজনদের অসুস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করা আগের চেয়ে অনেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

COVID-19 ভ্যাকসিনিগুলি অসুস্থতা, হাসপাতালে ভরতি হওয়া এবং এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি কমাতেও নিরাপদ এবং অত্যন্ত কার্যকর।

আপনি একটি COVID-19 ভ্যাকসিনি পতে পারেন আপনার নিজ পকেট থেকে কেবল 10 মিনিটের মধ্যে।

আপনার জন্য কেবল 10 ভ্যাকসিনিটি সঠিক সন্মিলন করে আরও জানুন। QR কোডটি স্ক্যান করুন বা কল করুন **1-844-NYC-4NYC (1-844-692-4692)** নম্বরে।

COVID-19 ভ্যাকসিনি
সম্পর্কে আরও জানুন



COVID-19-এর জন্য কার ভ্যাকসিনি নওয়া উচিত?

- + 6 মাস থেকে 4 বছর বয়সী শিশুরা Pfizer-BioNTech এর তিনটি পডেয়াটরিক ডোজ (এক-দশমাংশ শক্তরি) পতে পারে
- + 5 থেকে 11 বছর বয়সী শিশুরা Pfizer-BioNTech-এর দুটি পডেয়াটরিক ডোজ (এক-তৃতীয়াংশ শক্তরি) পতে পারে
- + 12 বছর বা তার বেশি বয়সের শিশু ও প্রাপ্তবয়স্করা Pfizer-BioNTech-এর দুটি ডোজ পতে পারেন
- + 18 বছর বা তার বেশি বয়সের প্রাপ্তবয়স্করা Moderna-এর দুটি ডোজ, বা Johnson & Johnson/Janssen-এর একটি ডোজ পতে পারেন
- + 5 বছর বা তার বেশি বয়সের শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্করা যাদের একটি অবস্থা বা চকিমাগত কারণে দুর্বল প্রতরিরে াধ কক্ষমতা রয়েছে তারা একটি অতিরিক্ত Pfizer প্রাথমিক সরিজিরে ডোজ পতে পারেন — যা তৃতীয় ডোজ নামেও পরচিতি।

কাদরে একটি COVID-19 বুস্টার শট পাওয়া উচিত?

5 বছর বা তার বেশি বয়সী প্রতয়কেইে তাদরে প্রাথমিক Pfizer বা Moderna COVID-19 ভ্যাকসিনি সরিজিরে দ্বিতীয় ডোজ পাওয়ার অন্তত পাঁচ মাস পরে একটি বুস্টার শট নওয়া উচিত।

যে সমস্ত ব্যক্তরি Pfizer বা Moderna ভ্যাকসিনিরে দুটি শট পয়েছেনে তাদরে বুস্টার হিসেবে একই ভ্যাকসিনি নওয়ার চেষ্টা করা উচিত, তবে তাদরে মারকনি যুক্তরাষ্টরে অনুমোদিত তনি ধরনরে ভ্যাকসিনিরে মধ্য থেকে যেকে নও একটিতে পরবিরতন করার স্বাধীনতা রয়েছে।

5 থেকে 17 বছর বয়সী যসেব ব্যক্তরি পাঁচ মাসরেও আগে Pfizer-এর প্রাথমিক সরিজিরে ভ্যাকসিনি পয়েছেলিনে তারা কেবল Pfizer-এর বুস্টার শটরে জন্যই যোগ্য।

18 বছর বা তার বেশি বয়সী প্রতয়কেইে যারা Johnson & Johnson ভ্যাকসিনি পয়েছেনে তাদরে প্রাথমিক ডোজ পাওয়ার অন্তত দুই মাস পর একটি বুস্টার শট নওয়া উচিত। Pfizer বা Moderna (mRNA COVID-19 ভ্যাকসিনি) বুস্টারগুলিকে বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে অগ্রাধিকার দয়ো হয়।

যসেকল ইমডিনে একমপরে ামাইজড ব্যক্তরি প্রথম ডোজ হিসেবে J&J পয়েছেনে এবং অন্তত 28 দিন পরে অতিরিক্ত ডোজ হিসেবে একটি mRNA ভ্যাকসিনি পয়েছেনে তাদরে mRNA ভ্যাকসিনিরে অতিরিক্ত ডোজ নওয়ার অন্তত দুই মাস পর মটে তনিটি ডোজে একটি mRNA ভ্যাকসিনিরে বুস্টার ডোজ পাওয়া উচিত।

NYC Health + Hospitals ব্যবস্থার হাসপাতাল সমূহ Pfizer এবং J&J ভ্যাকসিনিগুলি দরিয়ে থাকে। NYC Health + Hospitals/Gotham Health কলেদরসমূহ 5 থেকে 11 বছর বয়সী শিশুরেকে Moderna ভ্যাকসিনি ও Pfizer ভ্যাকসিনি দরিয়ে থাকে। অবস্থানরে একটি সমপূর্ণ তালকিা জন্য, আমাদরে ওয়েবসাইটে ভিজিটি করুন: [nychealthandhospitals.org](https://www.nychealthandhospitals.org) -এই ঠকিলায়।